



PÁCIENS NEVE: Péter Petra
SZÜLETETT: 1989.07.29.
LAKCÍM: 2040 Budaörs, Szabadság út 296.
TELEFONSZÁM: (+36-30) 353-0844
TAJ: 091-425-799

VIZSGÁLÓ ORVOS: Dr. Gasztonyi Zoltán
MSZNUT SZÁMA: B 220
FMF ID: 15786
KÉSZÜLÉK: GE Voluson-E10
LELET AZONOSÍTÓ: UH25011340800MT

UTOLSÓ MENSES ELSŐ NAPJA: 2024.10.24.
A VÉRZÉSKIMARADÁS IDŐTARTAMA: 20 HÉT 0 NAP

VIZSGÁLAT LEÍRÁSA:

A gravid uterusban egy élő, jól mozgó magzat, koponyavégű fekvésben látható.
Magzatvíz mennyisége: átlagos. Köldökzsinór centrálisan ered, benne 3 ér látható.
Méhlepény helyzete: hátsó falon tapad.
A lepény szerkezet homogén, szabályos.

RÉSZLETES MAGZATI ANATÓMIA

Agykoponya és arckoponya

Ép koponyacsontok, szabályos alakú koponya. A cavum septi pellucidi (CSP), a falx cerebri, a thalamus, a III. agykamra, a cerebellum, cisterna magna, valamint az oldalkamrák hátsó szarva és a plexus chorioideus normálisak. Normál tágasságú liquorterek. Az oldalkamrák szimmetrikusak, a mellső-, hátsó szarv-, átrium, szabályos méretűek. Fossa posterior: A cerebellum mérete és szerkezete szabályos. A kisagyi vermis jól látható, szabályos. A cisterna magna (CM) szabályos, a IV. agykamra és a CM közötti kóros összeköttetés, kóros képlet nem látható. A corpus callosum ábrázolódik, mérete szabályosnak imponál. Szabályos lefutású artéria pericallosa. Az arckoponya épnek imponál: Orrcsont megjelenése, transorbitális sík szabályos.
NB (6,7 mm) / PT (2,6 mm) arány: 2,6, normális.
Épnek tűnő ajkak és alveoláris szápad. Nyaki régió eltérés nélkül. NF: 3,79 mm. A magzati nyelv a szájüregben normális pozícióban látható. Szemlencsék láthatóak. Orbitális távolság (külső-külső, belső-belső) normál tartományban.

CSP mérete: 7,3 X 3,5 mm
Cerebellum harántátmérő: 19 mm
Cisterna magna mérete: 5,12 mm
Oldalkamrák hátsó szarvának átmérője: 5,90 mm
IOD: 10,8 mm
BOD: 33 mm

Szív

Ritmikus szív működés, tengelyállás normális. Alakja, nagysága, elhelyezkedése normális.
Szabályos négy üreg ábrázolódik. Megközelítőleg egyenlő méretű kamrák és pitvarok. Crux cordis ábrázolódik. Normális billentyűmozgások. Folytonos kamrai septum, a kiáramlási pályák szabályos lefutásúak és egyenlőek, egymást keresztezik. Az aorta a bal kamrából, az artéria pulmonális a jobb kamrából ered. Szabályosnak tűnő aortaív a gerinc bal oldalán.
Kóros lefutású artéria subclavia (ARSA) nem ábrázolódik.
Szabályos háromeres síkban a thymus ábrázolódik, normál thymus-mellkasi arány (TT-ratio 0,4) látható.

A thymus mérete: 7,6 X 9,4 mm



Mellkas

Részarányos, zárt, alakja szabályos, a tüdők normális echogenitásúak. Zárt rekeszív.

Gerinc

Párhuzamos vonalú, szabályos lefutású, a csigolyaívek zártak. Mindkét oldalon szabályos bordák.

Hasfal és hasüreg

Zárt hasfal, ép köldökzsinór eredés. Gyomortelődés kimutatható a hasüreg bal oldalán. Normál hasi echogenitás. Epehólyag látható a jobb oldalon. Zárt rekeszív.

Umbilico- portális rendszer: A véna umbilicális lefutása szabályos. A bal véna portae superior- inferior- es medium ága követhető. A portális sinus és jobb véna portae szabályos.

A ductus venosusban szabályos áramlás, pozitív „a” hullám.

Vesék mindkét oldalon fiziológiásak, normális tágasságú üregrendszerrel. Szabályosan telődő hólyag.

Két artéria renális látható.

Végtagok

A négy végtag három szegmense látható, alaki eltérés jelenleg nem ábrázolódik, lábfej-lábszár szög fiziológiás. A kisujj középső perce látható.

Körülírt kóros folyadékgyülem a testüregekben nem észlelhető. Subcutan oedema nincs.

MAGZATI MÉRETEK:

BPD (fej átmérője):	44,0 mm	FL (combcsont hossza):	32,5 mm
HC (fej körfogata):	159,0 mm	HUM (felkarcsont hossza):	30,0 mm
AC (has körfogata):	135,4 mm		
Becsült magzati súly:	294 g		

Biometria alapján a magzat 19 hét 0 napos.

DIAGNÓZIS:

Magzati rendellenesség nem látható

JAVASLAT:

ARSA miatt magzati szívultrahang vizsgálat javasolt.

Az MSZNUT, az ISUOG és az FMF érvényben lévő szakmai protokollja szerint végzett ultrahang vizsgálat során egyéb eltérésre utaló jel jelenleg nem észlelhető.

A terhesség alatti ultrahang-szűrővizsgálatok során a rendelkezésre álló készülékkel az egészségügyi szakmai irányelvben előírtak betartása mellett az egyes magzati rendellenességek kimutathatósága a rendellenesség típusától, a magzatvíz mennyiségétől és a vizsgált személy testalkatától függően változó mértékű, de soha nem éri el a 100%-ot. Ennek következtében még a legmodernebb ultrahang-készüléket alkalmazva, a legjobban képzett szakemberek által, a leg gondosabban végzett vizsgálatok mellett sem lehet minden esetben az összes fejlődési rendellenességet felismerni, és ezt számos nemzetközi vizsgálat is igazolta. Ebből következően a negatív ultrahangvizsgálati lelet nem zárja ki bármely szerv rendellenességének lehetőségét!